

DESCRIPTIONS DE FORMES NOUVELLES DE LÉPIDOPTÈRES RHOPALOCÈRES
[NYMPHALIDAE],

PAR M. FD. LE CERF.

CHARAXES PLEIONE God.

Décrite en 1829 (?) par Godart dans l'*Encyclopédie méthodique* (IX, p. 366) sous le nom de *Nymphalis pleione*, cette espèce est restée jusqu'ici méconnue par la faute de l'auteur qui lui attribuait, avec doute il est vrai, les Antilles pour patrie. Cette indication erronée a trompé tous les Lépidoptéristes qui se sont occupés des Nymphalides, à commencer par Doubleday, qui, en 1850, décrivit, dans *Genera of diurnal Lepidoptera*, un *Philognoma lichas* de l'Ashanti, rapporté depuis au genre *Charaxes* O., et figurant maintenant dans tous les ouvrages et toutes les collections comme *Charaxes lichas* Dbd.

Or, en procédant au classement des *Charaxes* africains de la collection du Muséum, j'ai retrouvé les deux ♂♂ types du *N. pleione* God. et j'ai constaté qu'ils concordent avec la figure originale de *C. (= Phil.) lichas* Dbd. Ce nom doit donc être placé en synonyme de *C. (= Nymph.) pleione* God. qui a la priorité.

CHARAXES AUTAMBOULOU Luc. f. (? an s-sp.) **meridionalis** nova.

Diffère de la race typique par les caractères suivants :

Taille en moyenne plus petite, fond jaune un peu clair, ailes supérieures plus fortement falquées et acuminées, taches jaunes des deux paires un peu plus grandes. Ailes inférieures à bande terminale brune légèrement moins large, ses deux taches terminales — entre 2 et 4 — pâles, bien séparées, largement tachées de bleu lilas sous le trait jaune et soulignées par une ligne verdâtre diffuse. Dessous en général plus clair et à dessins plus nets, parfois entièrement absents aux inférieures.

Envergure : ♂, 72/75 millimètres ; ♀, 84 millimètres.

Types : 5 ♂♂ (1 ♂ H. T.) 1 ♀, Madagascar, Fianarantsoa, ex coll. L. et J. de Joannis, Muséum National de Paris.

CHARAXES ZOOOLINA-NEANTHES Hew. f. indiv. **homochroa** nova.

Caractérisée par la disparition complète des dessins cellulaires et terminaux bruns, excepté aux ailes inférieures où quelques petits points bruns marquent, entre les nervures, l'emplacement de la ligne discale.

Dessous fauve terne uni, avec la ligne médiane grise à bord interne blanc, fortement marquée.

Envergure, 51 millimètres.

Type : 1 ♂ Delagoa-Bay, Lourenço-Marques, 1885, achat Depuiset, Coll. Muséum National de Paris.

CHARAXES ZOOOLINA-BETSIMISARAKA Luc., f. (? an s-sp.) **firmus** nova.

Présente avec la race typique les différences suivantes :

Taille plus grande, queue de la nervure 4 des ailes inférieures plus courte et obtuse (1,5 millim. au lieu de 3 millim.), bordure noire des supérieures un peu plus large, à point subapical blanc vestigial et points blancs entre les nervures 2-5 absents ; points blancs de la bande terminale des ailes inférieures réduits à 3, très petits, entre les nervures 2-5. En dessous, tous les dessins bruns sont plus larges et bien plus foncés.

Envergure, 53-56 millimètres.

Types : 2 ♂♂ (1 ♂ H. T.), Madagascar, ex Coll. R. Ward < Coll. R. Galichon, 1918, Coll. Muséum National de Paris.